

Cuidado de la circuncisión

Algunos padres deciden que a sus varones se les haga la circuncisión. La circuncisión es la extirpación de la piel (prepucio) alrededor de la cabeza del pene. Si usted decide que se haga la circuncisión, el doctor de su bebé la realizará en la enfermería. Su bebé deberá pesar más de cuatro libras (2 kg). Si su bebé es pequeño o si tiene algún problema médico, la circuncisión se pospondrá. A su bebé se le hará la circuncisión únicamente con su permiso. El doctor le hará firmar una autorización a usted antes que se efectúe la circuncisión.

Atención al confort


- El confort de su bebé es importante para nosotros. El doctor usará un medicamento para insensibilizar el área antes de la circuncisión.
- Durante la circuncisión, se ofrecerá al bebé un chupón previamente sumergido en agua azucarada. Se ha comprobado que esto ayuda a mitigar el dolor en los bebés.
- Su bebé necesitará que se lo tenga en brazos y se lo mime más durante las primeras 24 a 48 horas que siguen al procedimiento.
- Se colocará una gasa con vaselina alrededor de la cabeza del pene para evitar que se adhiera al pañal. La gasa deberá dejarse colocada durante las primeras 24 horas. Luego se podrá retirar.
- Después de las primeras 24 horas, coloque una pequeña cantidad de vaselina sobre el pene para evitar que se adhiera al pañal.

Más en la próxima página →

Obtenga más información sobre sus cuidados de salud.

Cuidado durante las primeras 24 horas después de la circuncisión

- Trate de no poner a su bebé de panza durante el mayor tiempo posible.
- Mantenga el área limpia y seca.
- Esté pendiente de la señales de una infección como enrojecimiento, inflamación o mal olor.
- Si su doctor se lo indica, use una gasa con vaselina alrededor de la cabeza del pene durante las primeras 24 horas.
- La gasa con vaselina debe cambiarse solamente si está muy sucia. Al retirar la gasa, use agua tibia para saturar la gasa y evitar tirar de la piel en el lugar de la circuncisión. La enfermera le enseñará cómo cambiar la gasa con vaselina.
- Recuerde lavarse las manos antes y después de cambiar la gasa.



Cuidado después de 48 horas

- Ponga un poco de vaselina en el área de carne viva del pene. Haga esto durante 5 a 7 días cada vez que cambie el pañal. Esto ayuda a que el pene sane y evita que se pegue al pañal.
- Su bebé puede bañarse en la tina únicamente después de que la circuncisión sane, lo cual generalmente tarda de 10 a 14 días.

Cambios normales

- Su bebé puede estar irritable y no comer bien. Esto debe durar alrededor de un día.
- Puede haber un poco de sangrado durante las primeras 48 horas.

- Puede haber un poco de inflamación.
- Es posible que haya una sustancia amarilla en donde se extirpó el prepucio. No trate de limpiar la sustancia amarilla; desaparecerá a medida que la circuncisión sane.

Cuándo llamar al doctor de su bebé

- Si sangra mucho o si un pañal tiene un área grande con sangre.
- Si hay enrojecimiento o inflamación.
- Si huele mal.
- Si tiene preguntas o está preocupada.

✦ **Hable con su médico u otras personas de su equipo de cuidados de salud si tiene preguntas. Puede solicitar más información por escrito de la Biblioteca de Información de Salud llamando al (614) 293-3707 o por correo electrónico a health-info@osu.edu.**