

Cómo Cuidar del Cordón del Bebé



Es importante mantener el cordón umbilical limpio y seco. Cuando limpie el cordón, esté alerta a las señales de una infección como el enrojecimiento, el mal olor o el drenaje.

- Mantenga el pañal del bebé doblado por debajo del muñón del cordón para que le entre el aire y la orina no lo toque.
- Cada vez que cambie el pañal, ponga alcohol del 70% en la base del cordón con una bolita de algodón. Continúe aplicando alcohol a la base del ombligo hasta que sane por completo y se seque. Estará sano cuando el cordón esté duro, seco y arrugado y la base esté rosada y seca.
- Cuando el muñón del cordón se desprenda, pueden haber unas cuantas gotas de sangre. No tiene por qué alarmarse. Si sigue sangrando o si hay señales de infección, llame al doctor de su bebé.
- Después de que el cordón se desprenda, continúe poniendo alcohol en la base del ombligo hasta que esté completamente seco, por lo general, de 7 a 10 días.
- No le dé a su bebé un baño en la tina hasta que el cordón umbilical se desprenda y el ombligo esté rosado y seco.
- No ponga sobre el ombligo de su bebé, objetos como corchos o monedas de plata de un dólar. Estos objetos tienen gérmenes que podrían infectar al bebé.



**Si quiere más información, por favor llame al Centro de Información al (614) 293-3703.
O escriba al correo electrónico: health-info@osu.edu.**

© Copyright, (7/2002)
Department of Women and Infants
The Ohio State University Medical Center

- ▶ Upon request all patient education handouts are available in other formats for people with special hearing, vision and language problems, call (614) 293-3191.